

Poly-Alcohol Hände-Antisepticum

LYSOFORM
Seit ▪ Since ▪ Depuis 1900



GEBRAUCHSINFORMATION

Bitte sorgfältig lesen!

POLY-ALCOHOL HÄNDE-ANTISEPTICUM

GEBRAUCHSFERTIG

70 ml 2-Propanol/100 ml Lösung zur Anwendung auf der Haut

STOFF- ODER INDIKATIONSGRUPPE, WIRKUNGSWEISE:

Gebrauchsfertiges, alkoholisches Händeantiseptikum. Bakterizid (inkl. TB), fungizid und begrenzt viruzid gemäß RKI Empfehlung Bundesgesundheitsblatt 3/2017. VAH-zertifiziert.

ANWENDUNGSGEBIETE

- hygienische und chirurgische Händedesinfektion

GEGENANZEIGEN:

Dieses Arzneimittel darf nicht angewendet werden, wenn Sie allergisch gegen 2-Propanol oder einen der sonstigen Bestandteile sind. Nicht auf der Schleimhaut oder im Augenbereich anwenden.

VORSICHTSMASSNAHMEN

FÜR DIE ANWENDUNG UND WARNHINWEISE:

Das Arzneimittel enthält Wollwachs. Wollwachs kann örtlich begrenzte Hautreizungen (z. B. Kontaktdermatitis) auslösen. Kontakt mit den

Alkoholisches Hände-Desinfektionsmittel für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion

Prüfung	Konzentration	Einwirkzeit
VAH – Händedesinfektion EN-Standardmethoden		
VAH – hygienische Händedesinfektion EN 1500	unverdünnt	30 s
VAH – chirurgische Händedesinfektion EN 12791	unverdünnt	1,5 min
DVV / RKI-Leitlinie – viruzide Wirkung		
begrenzt viruzid* (inkl. HIV / HBV / HCV)	unverdünnt	30 s
Vacciniavirus	unverdünnt	30 s
BVDV (Bovine Viral Diarrhea Virus)	unverdünnt	30 s
Influenza A	unverdünnt	30 s
Coronavirus (SARS)	unverdünnt	30 s
Rotavirus	unverdünnt	30 s
Adenovirus	unverdünnt	2,0 min
EN 14476 – viruzide Wirkung		
begrenzt viruzid*	unverdünnt	30 s
Norovirus (MNV) ^a	unverdünnt	30 s
EN 14348 – tuberkulozide Wirkung		
tuberkulozid	unverdünnt	30 s
RKI-Listung		
Wirkungsbereich A	unverdünnt	30 s
begrenzt viruzid*	unverdünnt	30 s

*gemäß RKI-Empfehlung, Bundesgesundheitsblatt 3/2017 ^a murines Norovirus = Surrogatvirus für humanes Norovirus

Augen sollte vermieden werden. Bei versehentlichen Spritzern ins Auge sofort gründlich mit viel Wasser ausspülen und einen Arzt konsultieren.

LISTUNG:

- VAH-Liste
- ÖGHMP-Liste
- RKI-Liste (Wirkungsbereich A und begrenzt viruzid*)

WECHSELWIRKUNGEN MIT ANDEREN

ARZNEIMITTELN:

Keine bekannt.



Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH
D-12247 Berlin, Kaiser-Wilhelm-Str. 133
Telefon: +49 30 77992-0, Fax: +49 30 77992-219
Mail: kontakt@lysoform.de, www.lysoform.de

MADE IN GERMANY

ART DER ANWENDUNG / DOSIERUNGSANLEITUNG

Äußerlich, unverdünnt anwenden!

Hygienische Hände-Desinfektion

Unverdünnt in die Hände einreiben, diese während 30 Sekunden feucht halten.

Chirurgische Hände-Desinfektion

Unverdünnt in die Hände und auf die Unterarme einreiben, diese während 1,5 Minuten feucht halten.

Eine begrenzt viruzide Wirkung wird in vitro nach 30 Sekunden erzielt.

NEBENWIRKUNGEN:

Mögliche bekannte Nebenwirkungen sind: Hautirritation, Hauttrockenheit, kontaktallergische Reaktionen.

MELDUNG VON NEBENWIRKUNGEN:

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Produktinformation angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

DAUER DER HALTBARKEIT:

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Behältnis angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats. Nach Anbruch 6 Monate haltbar.

ZUSAMMENSETZUNG

100 ml Lösung zur Anwendung auf der Haut enthalten: *Wirkstoff:* 2-Propanol 70 ml.
Sonstige Bestandteile: Gereinigtes Wasser, Lanolinpoly(oxyethylen)-75, Butan-1,3-diol.

DARREICHUNGSFORM UND INHALT:

Lösung zur Anwendung auf der Haut.
100 ml, 150 ml, 500 ml, 1000 ml, 5000 ml

EIGENSCHAFTEN

- besonders hautverträglich
- rückfettend
- breites Wirkungsspektrum
- sehr angenehm im Geruch

Durch eine Scheuer-Wisch-Desinfektion auf die Oberfläche aufbringen und mechanisch verteilen. Auf eine vollständige, lückenlose Benetzung achten und gemäß Anwendungsempfehlung einwirken lassen.

ZUR BEACHTUNG:

Alkohohlaltig, brennbar.
Vor der Anwendung elektrischer Geräte Hände gut trocknen lassen. Ein Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

PHARMAZEUTISCHER UNTERNEHMER

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH
Kaiser-Wilhelm-Straße 133
12247 Berlin
Tel.: +49 30 77992-0
Telefax +49 30 77992219

ZULASSUNGSNUMMER

zugelassenes Arzneimittel gem. AMG
Zul.-Nr.: 2929.00.00

VERSANDEINHEIT / PACKUNG

VERSANDEINHEIT / PACKUNG	ART.-NR.
30 x 150 ml-Flasche	71042
20 x 500 ml-Flasche	71043
10 x 1-Liter-Flasche	71045
2 x 5 Liter-Kanister	71046

PHARMAZENTRALNUMMERN:

150 ml:	PZN 06611549
500 ml:	PZN 06611555
1 l	PZN 06611561



Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH
D-12247 Berlin, Kaiser-Wilhelm-Str. 133
Telefon: +49 30 77992-0, Fax: +49 30 77992-219
Mail: kontakt@lysoform.de, www.lysoform.de

MADE IN GERMANY