

megroSKIN

2-Propanol 70% (V/V)

Alkoholische Lösung zur Hautdesinfektion

Produktinformation: megroSKIN ist eine gebrauchsfertige Lösung zur Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße, Hautdesinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken, Desinfektion talgdrüsenreicher Haut.

Zusammensetzung: 100 g enthalten:
Wirksamer Bestandteil: 2-Propanol 63,1 g.
Sonstiger Bestandteil: gereinigtes Wasser.

Wirkungsspektrum: Bakterizid, levurozid, tuberkulozid, begrenzt viruzid gem. RKI/DVV (inkl. HBV, HIV, HCV).

Indikationsgruppe: Desinfektionsmittel.

Art der Anwendung: Zum Auftragen auf die Haut.

Anwendungsgebiete: Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße, Hautdesinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken, Desinfektion talgdrüsenreicher Haut.

Dosierungsanleitung und Art der Anwendung: Zur Desinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße wird die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 15 Sekunden lang feucht gehalten. Zur Desinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken wird die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 1 Minute lang feucht gehalten. Zur Desinfektion von talgdrüsenreicher Haut wird die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 10 Minuten lang feucht gehalten.

Hinweise: Die Zeitangaben sind Mindestzeiten. Je nach zusätzlichen Erschwernissen (z.B. feuchte Haut, Verschmutzungen der Haut, Risiko des Eingriffs) sind die Einwirkzeiten zu verlängern. megroSKIN wirkt nicht sporenabtötend und ist daher für die Aufbewahrung steriler Instrumente und Spritzen nicht geeignet.

Desinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße	15 Sek. Haut mit der Lösung feucht halten
Desinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken	1 Min. Haut mit der Lösung feucht halten
Desinfektion von talgdrüsenreicher Haut	10 Min. Haut mit der Lösung feucht halten

Gegenanzeigen: Ist nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet.

Wechselwirkungen: Keine bekannt.

Nebenwirkungen: Beim Einreiben der Haut können Rötungen und leichtes Brennen auftreten.

Meldungen von Nebenwirkungen: Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht hier angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Verpackung:

250 ml Flasche	281.0250	PZN 02429405
----------------	----------	--------------

Warnhinweise: Leicht entzündlich! Von Zündquellen fernhalten! Dicht verschlossen lagern. Bei Verschütten der Lösung sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z.B. das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit und das Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden.

VAH gelistet.

Hersteller/Pharmazeutischer Unternehmer:
Dr. Schumacher GmbH, Am Roggenfeld 3, 34323 Malsfeld, Tel.: +49-56 64 - 94 96-0